



Conference: ECORFAN® 8th INTERNATIONAL COLLOQUIUM Education Sciences

Booklets



RENIECYT

Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas

2015-20795

CONACYT

RENIECYT - LATINDEX - Research Gate - DULCINEA - CLASE - Sudoc - HISPANA - SHERPA

UNIVERSIA - E-Revistas - Google Scholar - DOI - REDIB - Mendeley - DIALNET - ROAD - ORCID

Title: Trastorno depresivo en estudiantes de ciencias de la salud de la Universidad Michoacana

Author: Ma. Martha MARÍN-LAREDO, Josefina VALENZUELA-GANDARILLA, Claudia Guadalupe ÁLVAREZ-HUANTE, Vanessa JIMÉNEZ-IZQUIERO, Juan Cristóbal MORA-TÉLLEZ

Editorial label ECORFAN: 607-8324

BECORFAN Control Number: 2017-01

BECORFAN Classification (2017): 171117-0101

Pages: 20

RNA: 03-2010-032610115700-14

ECORFAN-México, S.C.

244 – 2 Itzopan Street
La Florida, Ecatepec Municipality
Mexico State, 55120 Zipcode
Phone: +52 1 55 6159 2296
Skype: ecorfan-mexico.s.c.

E-mail: contacto@ecorfan.org
Facebook: ECORFAN-México S. C.

Twitter: @EcorfanC:

www.ecorfan.org

Holdings

Bolivia	Honduras	China	Nicaragua
Cameroon	Guatemala	France	Republic of the Congo
El Salvador	Colombia	Ecuador	Dominica
Peru	Spain	Cuba	Haití
Argentina	Paraguay	Costa Rica	Venezuela
Czech Republic			

Introducción

Este estudio surge a través de la experiencia y observación de los estudiantes de la Facultad de Enfermería, así como de las diferentes carreras de las Ciencias de la Salud de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), ya que se identifica una sobrecarga de estrés debido a que los estudiantes realizan prácticas clínicas, tienen que acudir a clase, hacer tareas, investigaciones entre otros.

Aunado a lo anterior, los estudiantes tienen un tiempo reducido para abarcar todo el contenido semestral de cada unidad de aprendizaje, lo que en muchas ocasiones hace que los estudiantes padezcan alguna sintomatología de trastorno depresivo.


El objetivo fue analizar la prevalencia de trastorno depresivo en estudiantes de las carreras de Ciencias de la Salud de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Metodología


Estudio no experimental, descriptivo, correlacional y transversal. Previo consentimiento informado se encuestaron a 291 estudiantes de octavo semestre de las Facultades de Quimicofarmacobiología (106) Enfermería (92) y la Escuela de Salud Pública (93) de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. El instrumento fue creado por los autores de este trabajo, tomando como referencia el DSM IV (Pichot, López, & Valdés, 1995, pp. 345-350).

Consta de dos partes: factores sociodemográficos e institucionales, seis dimensiones con 23 ítems con escala tipo Likert. La confiabilidad del instrumento fue de .885 con alfa de Cronbach y por el Método de Mitades de .847 y .845 (Spearman- Brown y Guttman) respectivamente. Muestreo no probabilístico por conveniencia.


RESULTADOS




Edad de los estudiantes de Ciencias de la Salud




Sexo de los estudiantes de Ciencias de la Salud



Estado civil de los estudiantes de Ciencias de la Salud



Lugar de procedencia de los estudiantes de Ciencias de la Salud



Nivel socioeconómico de los estudiantes de Ciencias de la Salud

En relación a la prevalencia de depresión de los estudiantes de las Facultades y Escuela objeto de estudio se precisa que los estudiantes que presentaron *siempre y casi siempre mayor* depresión fueron los de la Facultad de Quimicofarmacobiología con un 2.7% (8), en seguida la Escuela de Salud Pública con 1.0 % (3) y por último la Facultad de Enfermería con un .7% (2).

En la asociación de la tristeza en los estudiantes según Facultad y Escuela se precisa que presentaron *siempre y casi siempre mayor* tristeza fue Quimicofarmacobiología con 6.9% (20) y Enfermería con 6.8% (20) y Salud Pública con 4.8% (14) $P=000$.

En la asociación ansiedad en los estudiantes según Dependencia Académica se observa que *siempre y casi siempre* los estudiantes de la Facultad de Quimicofarmacobiología presentaron ansiedad en un 8.6% (25) y Enfermería en un 7.3% (21) $P=.013$.

En la asociación dificultad para concentrarse en los estudios según Dependencia Académica se precisa que respondieron *siempre y casi siempre* los estudiantes de la facultad de Quimicofarmacobiología con 6.9% (20) Enfermería con 6.6% (19) y la Escuela de Salud Pública con 3.4% (19) $P=.042$.

En relación a la agresividad de los estudiantes del sexo masculino y femenino de las Facultades y Escuela objeto de estudio se precisa que las estudiantes femeninas respondieron *siempre y casi siempre* con 8.2% (24) y los masculinos 4.8% (14) $P=.034$.

Conclusiones

Respecto a los objetivos de la investigación se precisa:

El nivel de depresión de los estudiantes objeto de estudio es bajo, sin embargo se presenta mayormente en mujeres y las principales manifestaciones en ambos géneros es tristeza, ansiedad y dificultad para concentrarse en sus estudios.

Predomina la agresividad en las mujeres. Los estudiantes de la Facultad de Químicofarmacobiología son los que mayormente presentan algunas manifestaciones de depresión.

Los estudiantes mencionaron que el consumo de bebidas alcohólicas es una forma de solucionar los factores que les causan depresión.

Referencias

- Campo-Cabal G., G. S. (2001). Psicopatología en estudiantes Universitarios. *revista colombiana de psiquiatria* .
- Código civil. (12 de 09 de 2016). *Enciclopedia Jurídica*. Obtenido de Enciclopedia Juridica.: <http://www.encyclopedia-juridica.biz14.com/d/estado-civil/estado-civil.htm>
- Covarrubias, R. (07 de 11 de 2016). ¿Cómo prevenir la depresión? *La segunda online*. , págs. 3-4.
- Berenzon S, L. M. (07 de 11 de 2016). *Salud Pública de México*. Obtenido de Salud Pública de MExico: http://bvs.insp.mx/rsp/articulos/articulo_e4.php?id=002796

- Bousoño M, B. B. (2008). Complicaciones de la depresión. *Actas especiales de psiquiatria* , 44.
- Bousoño, M., Baca, E., Álvarez, E., Eguiluz, I., Martín, M., & et al. (s.f de s.f. de 2008). *Psiquiatría.com*. Recuperado el 17 de 07 de 2017, de Psiquiatria. com.
- EFE:SALUD. (01 de 10 de 2015). *EFE:SALUD*. Recuperado el 10 de 07 de 2017, de www.efesalud.com/las-cifras-de-la-depresión
- Guavita, S. P. (2006). Prevalencia de Sintomatología Depresiva. *Revista de la Facultad De Medicina De Bogota Colombia* , 76-87.



ECORFAN®

© ECORFAN-Mexico, S.C.

No part of this document covered by the Federal Copyright Law may be reproduced, transmitted or used in any form or medium, whether graphic, electronic or mechanical, including but not limited to the following: Citations in articles and comments Bibliographical, compilation of radio or electronic journalistic data. For the effects of articles 13, 162,163 fraction I, 164 fraction I, 168, 169,209 fraction III and other relative of the Federal Law of Copyright. Violations: Be forced to prosecute under Mexican copyright law. The use of general descriptive names, registered names, trademarks, in this publication do not imply, uniformly in the absence of a specific statement, that such names are exempt from the relevant protector in laws and regulations of Mexico and therefore free for General use of the international scientific community. BECORFAN is part of the media of ECORFAN-Mexico, S.C., E: 94-443.F: 008- (www.ecorfan.org/ booklets)